

110x175

R-00.0-0

뉴마그정
(산화마그네슘)

일반 의약품

분류번호:234

[원료약품 및 그 분량] 1정 중

- 유효성분 : 산화마그네슘(USP) 250mg
- 기타첨가제 : 미결정셀룰로오스, 스테아르산, 전분글리콜산나트륨, 전호화전분, 폴리비드성이산화규소, 셀크

[성상] 흰색의 원형정제

[효능·효과]

- 주효능효과
1) 다음 질환의 제산작용 및 증상의 개선 : 위.십이지장궤양, 위염, 위산과다
2) 변비증

[용법·용량]

- 0 성인
- 위.십이지장궤양, 위염, 위산과다 : 산화마그네슘으로서 1일 0.5-1g을 수회(여러 차례) 분할 경구투여한다.(먹는다,복용한다)
 - 변비증 : 1일 2g을 1-2회 분할 경구투여한다.(먹는다,복용한다)
다만, 초회는 최소량을 복용하고 변의 모양과 상태를 보면서 조금씩 증량 또는 감량한다.

[사용상의 주의사항]

- 다음 환자에는 투여하지 말 것
1) 신장에 환자(심한 신기능장애 환자에서 고마그네슘혈증이 나타날 수 있다.)
2) 설사 환자
- 다음 환자에는 신중히 투여할 것
1) 심기능 장애 환자
2) 고마그네슘혈증 환자
3) 고령자(만 65세 이상)
- 부작용
1) 소화기계 : 때때로 설사 등이 나타날 수 있다.
2) 대사이상 : 장기 대량투여에 의하여 고마그네슘혈증이 나타날 수 있으므로 충분히 관찰하고 이상이 인정되는 경우에는 감량 또는 휴약 등 적절한 처치를 한다.
- 다음과 같은 경우 이 약의 복용(사용)을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한한 이 첨부문서를 소지할 것
-복용 후 다음 증상이 나타난 경우
1) 순환기 : 일어섰을때 느끼는 현기증, 맥이 느려짐
2) 정신신경계 : 강한 졸음, 의식이 희미해짐
3) 기타 : 숨막힘, 근력저하, 구강건조, 구토
- 일반적 주의
마그네슘 중독증상이 나타나면 칼륨염을 주사한다.

6. 상호작용

- 1) 테트라사이클린계 항생물질의 흡수를 저해할 수 있으므로 병용투여하지 않는다.
- 2) 이 약의 흡착작용 또는 소화관내 체액의 pH 상승에 의해 병용 약물의 흡수, 배설에 영향을 줄 수 있으므로 신중히 투여한다.
- 3) 다량의 우유, 칼슘제와 병용시 우유 알칼리 증후군(고칼슘혈증, 고질소혈증, 알칼리증 등)이 나타날 수 있으므로 충분히 관찰하고 이러한 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지한다.

[저장방법] 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

[사용기한] 용기라벨 표시일까지

[포장단위] 1000경/병

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입하신 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

※ 이 첨부문서 작성일(2026.06.17) 이후 변경된 내용은 홈페이지(<https://jevak.co.kr>)나 소비자상담실(080-010-5510)로 문의 또는 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)을 참조하십시오.

※ 부작용보고 및 피해구제신청 : 한국의약품안전관리원(1644-6223, 14-3330)

 오스틴제약(주)

경기도 안산시 단원구 성곡로 146번길 20
소비자상담실: 080-010-5510